ما الذي يجب معرفته إذا كانت نتيجة فحص مرض الزهري إيجابية أثناء الحمل

AMERICAN COLLEGE of NURSE-MIDWIVES

الزهري مرض يمكن الشفاء منه.
كوني لطيفة ورفيقة مع نفسك إذا كانت نتيجة فحصك إيجابية.
العلاج بحقن البنسلين آمن أثناء الحمل ويمكن أن يحميكِ ويحمي طفلك.

لعلاج

- يعتمد عدد حقن البنسلين اللازمة للشفاء من مرض الزهري على مرحلة مرض الزهري.
- يحتاج معظم الأشخاص إلى ثلاث حقن. وتُحدد مواعيدها بفارق 7 أيام بين كل حقنة وأخرى. يجب عليك أخذ حقن البنسلين في مواعيدها المحددة تماماً للشفاء من مرض الزهري.

الآثار الجانبية المحتملة للعلاج

- الأثر الجانبي الأكثر شيوعًا هو ألم خفيف ومؤقت في موضع الحقن.
- اتصلي بالقابلة فوراً إذا عانيت من حمى / قشعريرة، أو صداع، و/أو آلام في العضلات خلال أول 24 ساعة من بدء العلاج، أو إذا لاحظت أي علامات لولادة مبكرة أو نقص في حركة الجنين.
- سيعاني 10% إلى 35% من الأشخاص من واحد أو أكثر من هذه الأعراض. وهذا تفاعل طبيعي مع العلاج وليس رد فعل تحسسي.

التأكد من الشفاء من مرض الزهري

- بعد 8 أسابيع من العلاج، سيتم إجراء فحص دم للتأكد من نجاح العلاج.

الجنس والشريك الجنسي

- يجب فحص أي شريك جنسي للتأكد من مرض الزهري وعلاجه إذا لزم الأمر.
- يمكن لمقدمي الرعاية الصحية والمتخصصين في إدارة الصحة المساعدة في إخطار الشريك (الشركاء) دون ذكر اسمك إذا كان ذلك مفيدًا.
- يجب تجنب جميع أشكال الاتصال الجنسي حتى مرور 7 أيام على إكمال علاجك وعلاج أي شريك جنسي.

فحص الطفل للكشف عن مرض الزهري

- إذا تبين أن نتيجة فحص الأم البيولوجية إيجابية لمرض الزهري أثناء الحمل و/أو ظهرت على الطفل علامات مرض الزهري مثل الطفح الجلدي أو إفرازات من الأنف، فسيتم فحص الطفل للتأكد من مرض الزهري.
- يشمل فحص مرض الزهري للرضع فحص الدم أو أخذ عينة من قرحة أو طفح جلدي.
- في بعض الأحيان تكون نتيجة فحص الأطفال إيجابية رغم عدم إصابتهم بمرض الزهري. وذلك لأنهم يستمدون الأجسام المضادة من المشيمة أثناء الحمل. وتساعد فحوصات الدم المكررة عبر الوقت في تحديد ما إذا كانت النتيجة الإيجابية بسبب الأجسام المضادة أم بسبب عدوى الزهري.

علاج الطفل من مرض الزهري

- يجب علاج الأطفال من مرض الزهري إذا تلقت الأم البيولوجية العلاج قبل أقل من 03 يومًا من الولادة، وإذا ظهرت عليهم علامات مرض الزهري، و/أو كانت نتيجة الفحص إيجابية.
- يمكن علاج الأطفال بأمان بحقن البنسلين، وأحيانًا بحقنة واحدة أو في المستشفى لمدة 01 أيام.

أخبري ممرضة التوليد (القابلة)

إذا كانت لديك حساسية من البنسلين أو كنت مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. سيؤثر هذا على كيفية علاجك من مرض الزهري أثناء الحمل.