妊娠期
梅毒检测与治疗

AMERICAN COLLEGE of NURSE-MIDWIVES

梅毒是一种细菌感染，可以很容易地用抗生素治愈。
在美国，梅毒发病率正在上升，大多数人没有症状。
建议进行检测，因为高达 40% 的婴儿在母亲未经治疗的梅毒感染下出生后会死亡。

妊娠期梅毒的风险

- 它可能导致严重的健康问题，影响心脏、大脑和神经系统。
- 它可能导致流产、死产、早产、婴儿出生体重过低，以及婴儿的严重健康问题，如骨骼、大脑或器官损伤，以及婴儿死亡。

梅毒如何传播

- 梅毒通过与梅毒疮或皮疹的皮肤接触，或通过阴道性交、口交或肛交传播。
- 梅毒有四个阶段，在前两个阶段最容易传播。
- 婴儿可能在其母亲怀孕或分娩期间感染梅毒。

梅毒检测

- 大多数梅毒患者没有注意到任何症状，在接受检测之前也不知道自己患有梅毒。
- 梅毒检测是血液检测。在怀孕期间，作为常规抽血的一部分，会进行 1-3 次检测。第一次检测通常在您第一次就诊时进行。
- 检测是保密的，并由健康保险承保。
- 如果结果为阳性，将进行第二次检测以确认结果。
- 如果检测结果呈阳性，将通知卫生部门。这属于保密信息，有助于追踪梅毒并确保人们得到治疗。

治疗梅毒

- 在怀孕期间，孕妇可以使用一种名为青霉素的抗生素安全治愈梅毒。
- 在妊娠前三个月和中三个月进行治疗可为您的宝宝提供最大的保护。

建议在妊娠早期进行检测，因为在 30 周之前使用抗生素治愈梅毒，可以大大降低婴儿感染梅毒的几率。

请告知您的助产士

如果您过去曾经梅毒检测呈阳性并接受过治疗。这有助于您获得正确类型的检测。大多数曾经患过梅毒的人一生都会继续检测呈阳性，因为即使在完全治愈后，身体也会保留一些过去感染的抗体。