需要了解的信息
（如果您在怀孕期间梅毒检测呈阳性）

AMERICAN COLLEGE of NURSE-MIDWIVES

梅毒是可以治愈的。
如果您的检测结果呈阳性，请善待自己。
在妊娠期间，使用青霉素注射进行治疗是安全的，并且可以保护您和您的宝宝

治疗

- 治愈梅毒所需的青霉素注射次数取决于梅毒的阶段。
- 大多数人需要三次注射。注射间隔为 7 天。您必须严格按照计划接受青霉素注射，以治愈梅毒。

治疗可能的副作用

- 最常见的副作用是注射部位轻微的暂时性疼痛。
- 如果您在开始治疗后的 24 小时内出现发烧/发冷、头痛和/或肌肉疼痛，或者出现任何早产迹象或胎儿活动减少，请立即联系您的助产士。
- 10%-35% 的人会出现其中一种或多种症状。这是对治疗的反应，而不是过敏反应。

确保梅毒得到治愈

- 将在治疗 8 周后进行血液检测，以确保治疗有效。

性行为和性伴侣

- 任何性伴侣都应进行梅毒检测，并在必要时接受治疗。
- 如果有帮助，护理提供者和卫生部门专业人员可以帮助通知性伴侣，而不透露您的姓名。
- 在您和所有性伴侣均完成治疗后至少 7 天内，应避免任何形式的性接触。

检查婴儿是否患有梅毒

- 如果生母在怀孕期间梅毒检测呈阳性，和/或婴儿出现梅毒症状，如皮疹或鼻腔分泌物，则应对婴儿进行梅毒检测。
- 婴儿的梅毒检测包括血液检测或从疮或皮疹中采样
- 有时婴儿即使没有梅毒，其检测结果也会呈阳性。这是因为在母亲怀孕期间，婴儿可能从胎盘中获得抗体。随着时间的推移进行多次血液检测，我们可以得知阳性结果是由于抗体还是梅毒感染。

治疗婴儿的梅毒

- 如果婴儿的生母在分娩前不到 30 天接受了治疗，如果婴儿出现梅毒症状，和/或检测呈阳性，则应对婴儿进行梅毒治疗。
- 可以使用青霉素注射安全治疗婴儿，有时是一次注射，有时是在医院接受 10 天的治疗。

请告知您的助产士

如果您对青霉素过敏或感染了 HIV。
这将影响您在怀孕期间的梅毒治疗方式。